



azdelta

Uw ziekenhuis.

Gehecht en nu?

Informatiebrochure

Contact

dienst spoedgevallen

campus Wilgenstraat

t 051 23 77 08

e spoed@azdelta.be

campus Menen

t 056 52 25 00

e spoed.menen@azdelta.be

Beste patiënt

U bent vandaag langsgekomen op de dienst spoedgevallen. Afhankelijk van de diepte, de lengte en de plaats van de wonde, werd de wonde gehecht, geniet of gelijmd. U hebt mondeling de instructies gekregen van onze artsen en verpleegkundigen. Deze kunt u in deze infobrochure nog eens nalezen. Soms zijn er afwijkende instructies, indien dit bij u het geval is, werd u hierover ingelicht door onze spoedartsen.

Na de ingreep is het verstandig u wat rustig te houden, hierna volgen enkele belangrijke aandachtspunten.

Aandachtspunten

- Een verse grote wonde kan de volgende uren nog heftig kloppen en zwellen. U kunt deze verschijnselen verminderen door bijvoorbeeld bij een wonde aan de arm, de arm wat hoger op een kussen te leggen. Of het been wat hoger te leggen bij een wonde aan het been, ...

- Houd het afdekkend verband drie dagen dicht. Hoe meer een verband geopend wordt, hoe meer kans er is op het binnendringen van bacteriën met een infectie tot gevolg.
- Zorg dat de wonde niet in aanraking komt met water of vuil. Ga zeker niet zwemmen. Douchen kan met een afsluitend verband.
- De spoedarts zal u uitleggen wanneer de huisarts de draadjes of nietjes mag verwijderen.
- Bij een wonde in het hoofdhaar wordt een spray aangebracht. Vermijd de eerste 3 dagen direct contact met water, zeep en haarspray. Het haar rond de wonde mag wel worden gewassen.

Wondlijm

- Houd de wonde drie dagen droog en schoon;
- Vermijd langdurig contact met water;
- Gebruik geen zeep, crème of spray op het wondgebied. Deze kunnen de wondlijm afbreken;
- Grijze verkleuring is normaal na enkele dagen;
- Na een week kan zich een korst vormen, waardoor de lijmlaag gaat verdwijnen.

Alarmtekens

Contacteer bij volgende klachten onmiddellijk de huisarts

- bij toenemende pijn binnen de 24 uren na de hechting
- bij toenemende zwelling en roodheid binnen de 24 uren na de hechting
- wanneer er etter uit de wonde loopt
- wanneer u koorts of koude rillingen krijgt
- als de hechtingen openbarsten

Wij wensen u een spoedig herstel toe!